

## A COMERCIALIZAÇÃO DO CITRATO DE SILDENAFILA (VIAGRA®)

Alexandra Daniella Néri<sup>1</sup>  
Josiane Aparecida Franco da Silva<sup>1</sup>  
Aline Fávero Martis<sup>1</sup>  
Patrícia Ribeiro Amador<sup>1</sup>  
Joana Ercilia Aguiar<sup>2</sup>  
Kelly Cristina Suzue Iamaguchi Luz<sup>3</sup>  
Aline Cardoso Machado Moliterno<sup>4</sup>

O citrato de sildenafil (Viagra®) foi sintetizado por um grupo de pesquisadores do grupo Pfizer, nos Estados Unidos. Primeiramente foi estudada para o uso em hipertensão e angina, mas concluíram que a droga induzia fortemente ereções penianas, sendo conseqüentemente comercializadas como tratamento para disfunção erétil, ao invés de angina, tornando-se um grande sucesso. Trata-se de medicamento de venda controlada, com comercialização restrita e a indicação médica, nas farmácias se exigia a receita médica, que ficava retida. A pesquisa propõe definir a comercialização do Viagra® e reconhecer o usuário deste medicamento. A amostra foi constituída por 30 homens com idade entre 30 e 72 anos, que adquiriram o Viagra® em uma farmácia na cidade de Maringá/Pr. O questionário foi aplicado no momento da compra, nos meses de abril a junho de 2008. Observou-se que 47% dos homens entrevistados têm mais de 60 anos, quanto a frequência do consumo do Viagra®, verificou-se que 6,5% fazem o uso semanalmente, 23,5% quinzenalmente e 70% mensalmente. Observou-se fatores de risco para o uso desta medicação, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e renais e apenas 30% dos pesquisados não têm nenhum tipo de problema. 30% iniciaram a medicação apenas por curiosidade e aprovaram os resultados dando continuidade do uso, 53,34% responderam que o uso é por indicação médica, apesar de que nem todos apresentaram a receita médica, alegando esquecimento, 16,66% dos entrevistados receberam orientação não profissional. 27% relataram que o resultado foi satisfatório e ignoravam efeitos adversos. Para a aquisição do viagra®, 57% não apresentaram a receita médica, demonstrando a venda descontrolada de medicamentos restritos à indicação médica. O uso de medicamento para diminuir as disfunções eréteis, como o sildenafil, se tornou uma alternativa para muitos homens contra a insegurança na relação sexual, pois com o envelhecimento o desejo e desempenho sexuais são alterados.

<sup>1</sup> Acadêmicas do Curso de Graduação em Enfermagem pelo Centro Universitário de Maringá - CESUMAR

<sup>2</sup> Enfermeira Mestre. Docente do Centro Universitário de Maringá - CESUMAR

<sup>3</sup> Enfermeira especialista. Docente do Centro Universitário de Maringá - CESUMAR

<sup>4</sup> Enfermeira especialista. Coordenadora de Práticas Clínicas do Curso de Enfermagem do Centro Universitário de Maringá - CESUMAR